




TUBANE KASS

Kass, kes elab tubast eluviisi või pääseb rõdule, taraga piiratud aeda. Kass ei söö tõenäoliselt närilisi, kassile ei tooda ka õuest tuppa muru.



RISKI GRUPP A

Ussirohtu anda **1-2 x aastas** soole nematoodide vastu (korrata ussirohtu 14 päeva pärast), (või **väljaheite uuring** ja ravida vastavalt tulemustele-võib anda võltsturvatunde*).

VABAKÄIGU KASS

Kassil on piiramatu liikumisvabadus, puutub kokku teiste kassidega, peab jahti ning ilmselt ka sööb närilisi.



RISKI GRUPP B

Ussirohtu manustada 4-12 x aastas soole nematoodide vastu, (või **väljaheite uuring** ja ravida vastavalt tulemustele- võib anda võltsturvatunde*). Ravida 4-12 x aastas paelussi vastu.

*Väljaheite uuring- kindlasti vajalik koguda ja uurida mitme päeva väljaheidet. Väljaheite proovist otsime ussimune, aga munevad ainult emased täiskasvanud parasiidid, st ainult veerand populatsioonist muneb ja eritab mune, mida saaksime väljaheite proovist leida. Seetõttu võib tekitada võltsturvatunde parasiitidega mitte nakatumise osas. Uurimiseks saata väljaheite proov Laboklini laborisse.

ÜMARUSSID	
Kassipojad	Esimene ussirohi 21.päeval peale sündi, edasi iga 2 nädala järel kuni on möödas 2 nädalat imetamisest. Kui on jätkuv suur risk (nt vaba õues liikumine), siis iga kuu kuni 6 kuuseks saamiseni.
Tiined emaskassid	Ühekordne ravi emodepsiidi spot-on (Profender sisaldab prasikvanteel+emodepsiid) lahusega u 7 päeva enne eeldatavat poegimist ennetamaks iatogeenset <i>Toxocara cati</i> larvide ülekannet kassipoegadele.
Imetavad emaskassid	Esimene ussirohi koos kassipoegade (u 3 nädalat peale poegimist).
Suurema riskiga kassid (osalevad võistlustel, näitustel, kes elavad kassikasvandustes jne)	2 ravikuuri: 2 nädalat enne ja 2-4 nädalat pärast üritust. Kassikasvandustes - ravi 1 x kuus või (roojaproovi uurimine 1 x kuus).
Kassid, kes elavad koos alla 5-6 a lastega, immuunpuudulike inimestega või eakatega	Sõltub riskianalüüsist, planeeritud ussirohu manustamine 1 x kuus (või roojaproovi uurimine 1 x kuus).
PAELUSSID	
Toortoidu, toore liha, jahisaagi sööjad, jahti pidavad kassid	4 x aastas võiks uurida roojaproovi ja ravida vastavalt leidudele või manustada ussirohtu 4 x

	aastas. <i>Hydatigera taeniformis</i> (varasem <i>Taenia taeniformis</i>) domineerivad kasside paelusside tabanduse korral. <i>Echinococcus multilocularis</i> endeemistel aladel (Eesti on endeemiline) võivad närilisi söövad kassid levitada mitteaktiivseid mune, olles risk inimesele. Siiski, võrreldes koertega on munade eritamine märkimisväärselt madalam. Ravi 12 x aastast ennetab munade väljutamist kassidel.
Kirpudega tabandumine (<i>Dipylidium</i> vaheperemees)	Seni kuni kirpudega tabandumine on ravitud, likvideeritud.
KOPSUUSS (<i>Aelurostrongylus abstrusus</i> , <i>Troglostrongylus</i> spp)	Kommentaar: Eesti kassidel on Tartu Ülikoolis avastatud kopsuuss <i>Eucoleus aerophilus</i> sünonüüm <i>Capillaria aerophila</i> .
Endeemilises piirkonnas elades õues käivad kassid, kes söövad tiguseid, nälkjaid või jahivad linde, hiiri, reptiile	Ravida ennetavalt kopsuusside vastu igakuiselt aasta ringselt emodepsiid+prasikvanteel spot-on lahusega.
SÜDAMEUSS (<i>Dirofilaria immitis</i>)	
Kass, kes elavad endeemilises piirkonnas	Sääskede perioodil ravida makrotsükliliste laktoonidega igakuiselt (või vastavalt ravimi infolehele) seni kuni sääskede periood on vähemalt 30 päeva olnud lõppenud.
Endeemilisesse piirkonda reisimisel	Sääskede perioodil profülaktiline ravi makrotsükliliste laktoonidega 30 päeva enne endeemilisse piirkonda saabumist, jätkata igakuiselt kuni on tagasipöördumisest möödas 30 päeva.
Endeemilisest piirkonnast importimine	Kohe peale importimist. Infektsiooni suhtes kontrollimine mitte varem kui 6 kuu möödudes.

ESCCAP Worm in Dogs and Cats Control Guideline järgi tõlgitud, koostatud 16.03.2026 (H.Valk), täiendatud 14.04.2026.

https://www.esccap.org/uploads/docs/biu0jhej_0778_ESCCAP_GL1_English_2025_v21_1p.pdf