

Koertele ussirohu manustamise juhend Männimäe loomakliinikus



TUBANE KOER

Koer elab enamasti tubast elu või on kontrollitud õues käigud: koer ei puutu kokku teiste koertega, ei külasta parke, ei söödeta toortoitu, ei söö tigusid ega nälkjaid.

EI

RISKI GRUPP A

Ussirohtu anda **1-2 x aastas** soole nematoodide vastu (korrata 14 päeva pärast), (või **väljaheite uuring** ja ravida vastavalt tulemustele-võib anda võltsturvatunde*).

ÕUESKÄIV KOER

Koer käib vabalt õues, puutub kokku teiste koertega, peab jahti ning võimalusel sööb saaki ja/või sööb toortoitu.

EI

Koer sööb tigusid, nälkjaid või on nendega kokkupuutevõimalus (nt sööb muru), ei kaeva.

EI

RISKI GRUPP B

Ussirohtu anda **4 x aastas** soole nematoodide vastu (korrata 14 päeva pärast), (või **väljaheite uuring** ja ravida vastavalt tulemustele-võib anda võltsturvatunde*).

JAH

RISKI GRUPP C

Ussirohtu anda **4-12 x aastas** soole nematoodide ja kopsuusside vastu, (või **väljaheite uuring** ja ravida vastavalt tulemustele-võib anda võltsturvatunde*^{*}). Paelussi vastane ravi **4-12 x aastas**.

RISKI GRUPP D

Ussirohtu anda **4-12 x aastas** soole nematoodide ja kopsuusside vastu, (või **väljaheite uuring** ja ravida vastavalt tulemustele-võib anda võltsturvatunde*^{*}). Paelussi vastane ravi **12 x aastas**.

*Väljaheite uuring- kindlasti vajalik koguda ja uurida mitme päeva väljaheidet. Väljaheite proovist otsime ussimune, aga munevad ainult emased täiskasvanud parasiidid, st ainult veerand populatsioonist muneb ja eritab mune, mida saaksime väljaheite proovist leida. Seetõttu võib tekitada võltsturvatunde parasiitidega mitte nakatumise osas. Uurimiseks saata väljaheite proov Laboklini laborisse.

ÜMARUSSID	
Kutsikad	Esimene ussirohi 14.päeval peale sündi, edasi iga 2 nädala järel kuni 4 kuuseks saamiseni. Siis 1 x kuus iga kuu kuni 6 kuuseks saamiseni. Ja edasi vastavalt riski grupi määratlusele.
Tiined emaskoerad	Tiinele koerale manustada makrotsüklilisi laktoone 40nda-55nda tiinuspäeva vahel (või fenbendasooli iga päev 40ndast tiinuspäevast kuni 2.päevani peale poegimist).
Imetavad emaskoerad	Sõltub riskianalüüsist, kui <i>Echinococcuse</i> levik madal, siis 1 x kuus, (väljaheiteproovi uurimine 1 x kuus ja ravimine leidude järgi*).
Suurema riskiga koerad (sportkoerad, näitusekoerad, kes elavad kennelis jne)	Sõltub riskianalüüsist, planeeritud ussirohu manustamine 1 x kuus (või roojaproovi uurimine 1 x kuus*).
Koerad, kes elavad koos alla 5-6 a lastega, immuunpuudulikkusega inimestega või eakatega	Sõltub riskianalüüsist, planeeritud ussirohu manustamine 1 x kuus (või roojaproovi uurimine 1 x kuus*).

KOPSUUSSID/ANGIOSTRONGÜLUS	
Tigusid, nälkjaid söövad või nendega kontaktis, koerad, kes söövad muru	Individuaalne riskianalüüs, soovituslik igakuine ennetav ravi.
PAELUSSID	
Koerad, kes reisivad <i>Echinococcuse</i> levikupiirkondadesse (Eesti on endeemiline <i>Echinococcuse</i> osas)	Kõrge riskiga piirkondades 4 nädalat peale reisi algust, jätkata iga 4 nädala järel ning viimane ussiohi mitte hiljem kui 4 nädalat peale tagasijõudmist.
Toortoidu, toore liha, jahisaagi sööjad	Koerad, keda toidetakse toore lihaga, mis ei ole korralikult töödeldud (10 min 65 kraadi juures) või sügavkülmutatud (nädal aega -17 kuni -20 kraadi juures tööstusliku külmikuga, NB! Vajalik liha külmumine seest -20 kraadini) peaks paelussi vastu ravima iga 4 nädala järel.
Kirpudega tabandumine (<i>Dipylidiumi</i> vaheperemees)	Seni kuni kirpudega tabandumine ravitud, likvideeritud.
SÜDAMEUSS (<i>Dirofilaria immitis</i>)	
Koerad, kes elavad endeemilises piirkonnas	Sääskede perioodil ravida makrotsükliliste laktoonidega igakuiselt (või vastavalt ravimi infolehele) seni kuni sääskede periood on vähemalt 30 päeva olnud lõppenud.
Endeemilisesse piirkonda reisimisel	Sääskede perioodil profülaktiline ravi makrotsükliliste laktoonidega 30 päeva enne endeemilisse piirkonda saabumist, jätkata igakuiselt kuni on tagasipöördumisest möödas 30 päeva.
Endeemilisest piirkonnast importimine	Kohe peale importimist. Infektsiooni suhtes kontrollimine mitte varem kui 6 kuu möödudes.

ESCCAP Worm in Dogs and Cats Control Guideline järgi tõlgitud, koostatud 16.03.2026, täiendatud 14.04.2026 (H.Valk).

https://www.esccap.org/uploads/docs/biu0jhej_0778_ESCCAP_GL1__English_2025_v21_1p.pdf